



Lebosol 

**MADE IN
GERMANY**

TriMax SC

Sudėtinės neorganinės mikroelementinės trąšos
Mineralinės mikroelementinės trąšos suspensijos formos

8,4 % Varis kaip vario oksichloridas (139 g/l Cu)
11,8 % Manganas kaip mangano karbonatas (196 g/l Mn)
8,4 % Cinkas kaip cinko oksidas (139 g/l Zn)

neto težina 8,3 kg

5 l

sustainable plant nutrition



Lebosol®-TriMax SC

Pasėliai	Tikslas	Rekomendacijos	Laikas
Esant maisto medžiagų trūkumui augalai yra jautresni ligoms bei abiotiniam stresui. Lapų trąšos su mikro ar makro elementais užtikrina efektyvų ir greitą aprūpinimą maisto medžiagomis.			
Visos kultūros	Aprūpinti manganu, variu, cinku	0,5 – 1,5 l/ha (purškimui per lapus naudoti 200 – 400 l vandens)	Kuomet matomas trūkumas
Javai	Derlingumui, baltymų kiekiui, kokybei	0,5 – 1,5 l/ha	Kuomet susiformuoja pakankamas lapų kiekis
	Kai augalams trūksta vario	0,5 – 1,5 l/ha	Naudoti nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos
Daugiau informacijos tinklalapyje www.lebosol.de/en/			

Ingredientai: Sudedamosios dalys Vanduo CAS-No. 7732-18-5 (CMC1: pirminės medžiagos ir mišiniai), Mangano karbonatas CAS-No. 598-62-9 (CMC1), Vario oksichloridas CAS-No. 1332-65-6 (CMC1), Cinko oksidas CAS-No. 1314-13-2 (CMC1)

Prieš naudojant svarbu žinoti!

Suderinamumas: Mūsų produktus galima maišyti su plačiai naudojamomis augalų apsaugos priemonėmis. Visgi nėra įmanoma padaryti visų suderinamumo testų, taigi pirmiausiai reikėtų maišymo bandymus atlikti mažais kiekiais su planuojamais purkšti produktais. Maišant su trąšomis per lapus arba augalų apsaugos priemonėmis, pripildykite purkštuvą 2/3 vandens, o produktus įmaišykite atskirai. Lebosol® produktus visuomet įdėkite kaip paskutinį komponentą, sumaišytą su vandeniu. Naudokite iškart, nuolat maišydamai..

Naudojimas pagal gerosios žemės ūkio praktikos kodeksus.

Naudokite pakankamai vandens, kad būtų gausiai apipurkšti lapai, vengti sausros.

Veikimo trukmė: min. 2 valandas prieš laistymą arba lietu/ kritulius. Po naudojimo išplaukrite prietaisus.

Geriausias (nepradarytas) iki: žr. minimalaus laikymo datą ant viršutinio kanistro šono.

Saugojimas: Mūsų produktai testuojami prie -10 °C - +45 °C temperatūros ir gali būti sandėliuojami be jokių problemų tokios temperatūros ribose. Dėl šalčio susidarę kristalai ištirpsta juos atšildžius. Optimaliam mūsų produktų apdorojimui mes rekomenduojame sandėliuoti ir laikyti prie temperatūros nuo +5 °C.

UFI: 67A0-D0WA-V00K-JKA9

EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojingumo frazės: H302 Kenksminga prarijus. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės: P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P391 Surinkti išteklėjusių medžiagą. P501 Turinį/talpyklą išmeskite į šalinimo vietą pagal vietines/regionines/nacionalines/tautines taisykles.

Naudoti tik esant poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.



14.02.25 – LT – TriMax

Atsargiai



Importuotojas: UAB Scandagra · Biochemikų g. 6 · LT-57234, Kėdainiai

Gamintojas: Lebosol® Dünger GmbH · Wiesengasse 28 · 67471 Elmstein · Germany · Telefon: +49 6328 98494-0 · www.lebosol.de